

Gefährdungsbeurteilung für die Anwendung

BCL-Quat-Des®

Desinfektionspräparat, VAH-gelistet

ProduktNr: 1402

Druck: 21.08.2026

Dieses Produkt wurde mit folgender Verdünnung beurteilt:

1 Teil Produkt mit 12 Teilen Wasser

empfohlener Verdünnungsbereich 1 Teil Produkt mit 12 - 132 Teilen Wasser

Kennzeichnung / Gefahren

**Diese anwendungsfertige Lösung (Verdünnung nach Empfehlungsbereich)
ist nicht kennzeichnungspflichtig.**

Es ist kein Gefahrenpiktogramm erforderlich.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



2. Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung oder Überschreitung des Grenzwertes:

Geeigneten Atemschutz tragen.

Filter A-P2 (DIN EN 14387)

2. Augenschutz:

Schutzbrille (EN 166:2001).

2. Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

2. Handschutz:

0,4 mm Butylkautschuk -> 120 min (EN 374)

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen.

2. Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung (EN 340)

2. Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Entsorgung:

Die anwendungsfertige Zubereitung kann über das Abwassersystem entsorgt werden.

VERHALTEN IM GEFÄHRFALL

Feuchte/Nasse Kleidung ausziehen. Benetzte Körperstellen mit Wasser abspülen.

Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen, Rest mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.

Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen

ERSTE HILFE



1. Allgemeiner Hinweis: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen

1. Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, ausspülen.

Augenärztliche Behandlung.

1. Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen

1. Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

1. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Achtung bei Erbrechen. - Hohe Erstickenungsgefahr durch schäumende Bestandteile. Mund ausspülen. Einige Gläser Wasser zu trinken geben. Ob Brechreiz ausgelöst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden.

2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Vorsicht, Gefahr der Schaumaspiration.

3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezial: Symptomatisch behandeln.